

APLIKACE BIOKA PŘÍPRAVKŮ NA RÉVU VINNOU

POŘADÍ APLIKACE	TERMÍN OŠETŘENÍ	PRODUKT + KONCENTRACE [%]
1	BBCH 05-07 Začátek pučení (výhonky 20–30 cm)	BorOil 0,2 % + sirný přípravek 0,6 %
2	BBCH 11-19 Vývoj listů	Folicit 0,3 % + BiokaUrtica 0,2 % + CuproTonic 0,4 %
3	BBCH 53-57 Vývoj Květenství (před květem)	Folicit 0,4 % + CuproTonic 0,4 %
4	BBCH 60-69 Kvetení	Tento postřik POUZE v případě DLOUHÉHO kvetení a deště během kvetení: Chitopron 5 % 0,3 % + CuproTonic 0,4 %
5	BBCH 71-75 Tvorba bobulí (po odkvětu)	PowerOf-K 1,0 % + FerrumOil 0,2 % + BiokaUrtica 0,2 % + CuproTonic 0,4 % POKUD DOJDE K SILNÉ INFEKCI PLÍSNĚ: Místo CuproTonic aplikovat BURGUNDSKOU SMĚS*: Bioka SÍRAN MEĎNATÝ 0,3 % + PowerOf-K 0,3 %
6	BBCH 71-75 Tvorba bobulí	Imunofol 0,2 % + CuproTonic 0,2 % + Folicit 0,4 %
7	BBCH 77-79 Uzavírání střapců	PowerOf-K 1,0 % + FerrumOil 0,2 % + CuproTonic 0,2 %
8	BBCH 81-85 Začátek měknutí	PowerOf-K 1,0 % + FerrumOil 0,2 % + BiokaUrtica 0,2 % + CuproTonic 0,4 %
9	BBCH 86-89 Dozrávání	PowerOf-K 1,0 % + BorOil 0,2 %

*Bioka SÍRAN MĚNATÝ se rozpustí jako první a pak se přidá PowerOf-K

POZNÁMKY:

- V případě SILNÉHO TLAKU PADLÍ přidáme k postřikové kombinaci 6 nebo 7: BiokaURTICA 0,2 %
- Pokud je PADLÍ NA STŘAPCÍCH: kombinujeme PowerOf-K 2,0 % + Folicit 0,3 % (nepřidáváme smáčedlo)
- V případě PERONOSPÓRY NA STŘAPCÍCH: BURGUNDSKÁ SMĚS (Bioka SÍRAN MEĎNATÝ 0,3 % + PowerOf-K 0,3 %) + CuproTonic 0,4 % + BorOil 0,1 %